LA SANTÉ REPRODUCTIVE, MATERNELLE, NÉONATALE ET ADOLESCENTE EN TEMPS DE PANDÉMIE

les leçons apprises et les conseils pratiques

Mai 2020

Aperçu

- Introduction
- Principales épidémies de maladies infectieuses de 2002 à 2020
  - ✓ SARS_CoV
  - ✓ Ebola
  - ✓ Zika
  - ✓ MERS_CoV
- La santé de la mère et du nouveau-né pendant les pandémies
  - ✓ Leçons tirées
- La santé sexuelle et reproductive pendant les pandémies
  - ✓ Leçons tirées
- Violence basée sur le genre pendant les pandémies
  - ✓ Leçons tirées
- Perspectives Supplémentaires

Introduction

- Analyse documentaire des principales épidémies survenues au cours des dernières décennies, notamment le SRAS CoV, le VIH/SIDA, le virus Ebola, Zika et MERS CoV.

- Il est essentiel de reconnaître la manière dont les épidémies affectent les femmes, les enfants et les autres populations vulnérables et l'ampleur de leur impact pour mettre en place des mesures de réponse efficaces et équitables.

- Fournir un ensemble de leçons tirées des épidémies passées, en mettant l'accent sur la manière d'assurer la continuité des services de Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale et des Adolescents pendant la pandémie de Covid-19.

Le premier foyer documenté d'une maladie EBOV est apparu dans la ville de Yambuku
e us ont
p lentale
e 013 et
2 gnalés,
c écente
(nt des
répercussions négatives sur les activités de réponse de santé publique.

MERS-CoV, identifié pour la première fois en Arabie Saoudite en 2012. Jusqu'à présent, il y a eu plus de 2000 cas avec plus de 800 décès, dans 27 pays.



Santé Maternelle et Néonatale

- 7 millions de grossesses non désirées si les mesures de confinement se prolongent pendant 6 mois avec des interruptions significatives des services de santé.

Une autre étude estime que :

- Dans les pays en voie de développement, avec une baisse de 10 % de la couverture des services de soins essentiels, il est prévu:
- 1 745 000 cas additionnels de complications obstétriques majeures sans soins
- 28 000 décès maternels additionnels
- 2 591 000 cas additionnels de nouveau-nés souffrant de complications majeures
- 168 000 cas additionnels de mortalité de nouveau-nés.

Santé maternelle et néonatale

Les recommandations comprennent :

- Il est essentiel de diffuser des messages cohérents, qui aideront les femmes et leurs familles à demander des conseils à un stade précoce et à prendre des décisions en temps utile.

- Il est également essentiel de veiller à ce que les maternités soient toujours perçues comme des lieux sûrs.

- Afin de leur offrir un suivi et une protection adéquats, toutes les femmes enceintes devraient être régulièrement testées dans le cadre de leurs soins prénataux.

Santé Maternelle et Néonatale

Les recommandations comprennent :

- Les travailleurs de la santé devraient suivre une formation appropriée sur les pratiques de contrôle et de prévention des infections, ainsi que sur l'utilisation correcte des équipements de protection individuelle.

- L'établissement d'une prime de risque claire peut contribuer à motiver davantage le personnel de santé.

- Les femmes dont le test COVID-19 est positif, y compris celles qui allaitent, ne devraient pas être séparées de leurs enfants. Elles devraient plutôt prendre des précautions, comme le port de masque, lorsqu'elles allaitent leur bébé.

Santé Sexuelle et Reproductive

- Dans 114 pays à revenu faible et intermédiaire, 47 millions de femmes seraient dans l'impossibilité d'accéder à des méthodes de contraception modernes, si le confinement se prolonge pendant 6 mois.

- A chaque période de confinement qui se prolonge de 3 mois, ce sont jusqu'à 2 millions de femmes supplémentaires qui pourraient ne pas avoir accès aux méthodes de contraception modernes.

Santé Sexuelle et Reproductive

Les Recommandations comprennent :

- L'accès à la gamme complète des méthodes contraceptives devrait s'étendre au-delà des établissements de santé habituels.
- Campagnes de promotion informant les communautés sur les moyens de contraception et les endroits où ils peuvent être accédés.
- Éliminez les rumeurs et les malentendus et instaurez la confiance entre les membres de la communauté et les personnels de santé.

Santé Sexuelle et Reproductive

Les Recommandations comprennent:

- L'un des principaux enseignements tirés de la réponse à Ebola est que les besoins et les services de santé sexuelle et reproductive doivent être intégrés dès le départ dans la réponse à la pandemie.

- Un représentant des équipes de santé sexuelle et reproductive (SSR) doit faire partie des équipes de coordination des réponses à COVID-19.

- Il est important de veiller à ce qu'il y ait toujours une offre suffisante des différentes méthodes de contraception.

Violence Basée sur le Genre

- Si le confinement se poursuit pendant au moins 6 mois, on pourrait recenser 31 millions de cas supplémentaires de violence basée sur le genre.

- A chaque période de confinement qui se prolonge de 3 mois, on pourrait dénombrer 15 millions de cas supplémentaires de violence basée sur le genre.

Violence Basée sur le Genre

- Renforcer les systèmes de réponse initiale contre la violence. Les premiers intervenants doivent anticiper une flambée de violence liée au genre dès le début des pandémies et se préparer en conséquence, notamment en augmentant le personnel et les ressources de soutien.

- Les personnels de santé doivent être formés à l'identification des femmes victimes de violence.

- Les systèmes de santé doivent instituer des méthodes de protections pour les femmes travaillant dans le secteur de la santé afin d'atténuer les risques de harcèlement et de violence sexuels.

Violence Basée sur le Genre

- Utiliser la technologie pour aider les personnes en quarantaine qui ont besoin d'accéder aux services de lutte contre la violence. S'appuyer sur les initiatives existantes qui fournissent un soutien en ligne pour une aide juridique et un soutien psychosocial, en notant les disparités entre les sexes dans l'accès à la technologie.

- Développer les abris et les logements temporaires pour les survivants. Il est nécessaire de veiller à ce que des logements soient disponibles pour les femmes et les jeunes filles qui courent un risque élevé de violence dans leur foyer pendant les pandémies.

- Former les enseignants à soutenir la réintégration sociale des élèves à la réouverture des écoles et offrir à ces jeunes la possibilité de faire face aux difficultés et traumas qu'ils ont rencontrés.

Perspectives Supplementaires

- Le rôle du genre ajoute une autre couche de prédisposition à l'infection. Les femmes sont exposées de manière disproportionnée aux maladies infectieuses directement transmises en raison de leur rôle traditionnel de soignantes.

- Les enfants sont continuellement et systématiquement décrits comme des vecteurs du virus, car ils ne présentent souvent pas de symptômes. La culpabilité associée à cette accusation constante pourrait être traumatisante.

- Le développement de méthodes de collecte de données numériques permettra également de saisir des informations sur les femmes et les jeunes filles en situation de risque élevé. Ces applications permettront d'accélérer la détection, le signalement, la surveillance active et les réponses rapides, avec renvoi aux autorités compétentes.

Merci